

Efecto de la proporción de genes *Bos indicus* x *Bos taurus* sobre peso al destete y edad a primer parto en una población multirracial

Bos indicus x *Bos taurus* gene proportion over weaning weight and age at first parturition in a multi-breed population

Hugo O. Toledo Alvarado^a, José M. Berruelos Villalobos^a, Carlos G. Vázquez Peláez^a

RESUMEN

Se analizaron 1,289 registros de hembras de primer parto con diversas proporciones de genes *Bos indicus* y *Bos taurus* (Charolais, Suizo, Simmental, Holstein Friesian y Salers). Tanto animales puros y cruzados de un hato comercial, ubicado en el municipio de Hueytamalco, Puebla, nacidas entre 1966 a 2006, con el objetivo de estimar la combinación óptima de genes Cebú y la retención de heterosis (RVH) sobre las características de peso al destete ajustado a 270 días (PD) y edad a primer parto (EPP). A partir de modelos de regresión múltiple se identificó la proporción de Cebú con el mejor comportamiento para las dos características de acuerdo al coeficiente de determinación (R^2) y al estadístico de Mallow (CP). La mejor respuesta para PD se encontró en el rango de 42 a 70 % de genes *Bos indicus*; mientras que las menores EPP se establecieron entre 27 al 40 % de proporción Cebú. La retención de heterosis que mostró mayor potencial para PD fue de 76 a 78 % y para EPP de 79 a 92 %. Estos resultados manifiestan la importancia de los efectos no aditivos en ambas características, así como la necesidad de realizar cruzamientos dirigidos.

PALABRAS CLAVE: Heterosis, Retención de heterosis, Cebú, Peso al destete, Edad a primer parto, Bovino.

ABSTRACT

Records of 1,289 cows at first calving with different proportions of *Bos Indicus* and *Bos Taurus* genes (Charolais, Brown Swiss, Simmental, Holstein Friesian, Salers) were analyzed. The cows were both purebreds and crossbreds from a commercial herd born between 1966 and 2006. They were used to estimate the Zebu genes optimum combination on weaning weight adjusted to 270 d (WW) and age at first calving (AFC) in the tropics of México. Likewise, heterosis retention (RVH) and their contribution to WW and AFC, was estimated. Multiple regressions analysis was used to select the best two, three or more crossbreed's model for each trait, according to the square of the multiple correlation coefficients (R^2) and the Mallow statistic (CP). The results showed higher heterosis for WW between 42 to 70 % of *Bos indicus* genes. On the other hand, the best response to heterosis for a lower AFC was found in a proportion of Zebu genes ranging from 27 to 40 %. The retention of heterosis showed that the greatest potential for WW was 76 to 78 % and 79 to 92 % for AFC. These results demonstrate the importance of non-additive effects in both traits, and the need for controlled crosses.

KEY WORDS: Heterosis, Retention of heterosis, Zebu, Weaning weight, Age at first calving, Bovine.

INTRODUCCIÓN

Es común observar que los productores en las regiones tropicales realicen cruzamientos entre

INTRODUCTION

Cattle producers in tropical regions commonly work towards improving production traits by

Recibido el 20 de enero de 2012. Aceptado el 28 de agosto de 2012.

^a Departamento de Genética y Bioestadística, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Colpico el Alto, 04510 México DF. México. h.toledo.a@gmail.com. Correspondencia al primer autor.

diferentes razas en forma empírica para mejorar algunas características productivas, utilizando como población base hembras Cebú (*Bos indicus*) y apareándolas con sementales de razas europeas (*Bos taurus*), escogidas arbitrariamente y generando eventualmente poblaciones multirraciales. Cualquiera que sea el cruzamiento entre razas, se observará respuesta de vigor híbrido; sin embargo, para mantener niveles aceptables de heterosis en la población, es necesario establecer esquemas de cruzamiento que maximicen la respuesta de las características de interés del productor. Los efectos de cruzamientos entre dos o más razas ha sido ampliamente referido en la literatura⁽¹⁻¹²⁾, mostrando las ventajas que se obtienen debido a la heterosis, ya sea individual o materna, para características productivas y reproductivas en ganado de carne⁽¹³⁾. La mayor respuesta se alcanza cuando los animales cruzados presentan el 100 % de heterosis, resaltando la importancia de cruzamientos sistemáticos entre las diferentes razas, y explicado como la superioridad de los animales cruzados con respecto a las razas originales. Se ha mostrado que la proporción óptima entre el 50 y 80 % de genes *Bos taurus* expresan la mayor producción de leche en la crusa Europeo-Cebú en condiciones tropicales⁽¹⁴⁾.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la proporción óptima de genes *Bos Indicus: Bos taurus* y la retención de heterosis, sobre las características de peso al destete ajustado a 207 días, y edad a primer parto en vaquillas cruzadas productoras de carne en una población multirracial en el trópico mexicano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 1,289 registros de hembras de primer parto con diversas proporciones de genes *B. indicus* y *B. taurus* (Charolais, Suizo, Simmental, Holstein Friesian y Salers), tanto animales puros y cruzados; nacidas en el periodo de 1966 a 2006. Los registros se obtuvieron de un rancho comercial ubicado en el municipio

crossing different breeds based on empirical criteria. Zebu (*Bos indicus*) cows are mated with arbitrarily-selected European breed (*Bos taurus*) bulls, eventually creating multi-breed populations. Hybrid vigor occurs no matter the cross combination, but maintaining acceptable heterosis levels requires crossing systems that maximize response for desired traits. Extensive research into crossbreeding between two or more breeds⁽¹⁻¹²⁾ has shown that heterosis, be it individual or maternal, produces benefits for productive and reproductive traits in beef cattle⁽¹³⁾. Response is optimum in animals with 100 % heterosis, highlighting the importance of systematic crossbreeding and the superiority of cross-bred animals versus the original breeds. For example, optimum milk production under tropical conditions for European-Zebu crosses is attained with 50 to 80 % *Bos taurus* genes⁽¹⁴⁾. The present study objective was to determine the optimum *Bos Indicus:Bos taurus* gene proportion and retention of heterosis for 207-d adjusted weaning weight and age at first parturition in a multi-breed population of crossbred beef cattle in the tropics of Mexico.

MATERIALS AND METHODS

Analyses were done of 1,289 records for first parturition cows of various *B. indicus* x *B. taurus* (Charolais, Swiss, Simmental, Holstein, Friesian and Salers) gene proportions, both pure and crossbred, born between 1966 and 2006. Records were from a commercial ranch in Hueytamalco municipality, Puebla, Mexico. Located in the northeast mountains of the state of Puebla, regional climate is humid, semi-hot subtropical (Af[c]), with an annual average temperature of 20.8 °C, a minimum of 15.3 °C in winter, and a maximum of 24.2 °C in summer. Documented crosses involved 136 bulls, of which 86 were purebreds (Zebu [16], Charolais [22], Swiss [19], Simmental [10], Holstein [16], Salers [3]), and the remaining 50 were crosses with proportions of these breeds ranging from 6.25 to 75 %. Analysis was done of their contributions to the variables 270-d adjusted weaning weight (WW, in kilograms) and age at

de Hueytamalco, Puebla, México ubicado en la sierra nororiente del estado de Puebla y con clima subtropical húmedo–semicálido Af(c). La temperatura promedio anual es de 20.8 °C, la mínima de 15.3 °C en invierno, y la máxima es de 24.2 °C en verano. Se identificó la contribución sobre las variables de peso al destete ajustado a 270 días (PD) y la edad a primer parto (EPP) en días, de 136 diferentes sementales de las razas: Cebú (16), Charolais (22), Suizo (19), Simmental (10), Holstein (16), Salers (3), y de 50 sementales cruzados en diferentes proporciones entre estas razas, desde 6.25 a 75 %. Esto ha generado cruzamientos con varios grados de encaste sobre hembras cebú y cruzadas, por lo que el análisis de retención de heterosis o vigor híbrido puede ser identificado de acuerdo a la proporción de la raza materna y paterna.

La heterosis retenida (*RVH*) se estimó como⁽¹⁵⁾:

$$RVH = \left(1 - \sum_{i=1}^n Ps_i Pm_i \right)$$

Donde Ps_i es la proporción de la i -ésima raza del padre; Pm_i es la proporción de la i -ésima raza de la madre; n es el número total de razas involucradas.

La base de la alimentación fue pastoreo rotacional en potreros con pastos tropicales, manteniendo grupos de hembras de número variable; el apareamiento se realizó con monta natural controlada e inseminación artificial con semen importado de Estados Unidos de América. El criterio de selección de sementales fue arbitrario, ya que el ganadero seleccionaba la raza del toro por gustos personales, esperando que se diera la mejor cría de acuerdo a la composición racial de las vacas. Por lo que los porcentajes de razas varían desde animales puros hasta animales con la contribución de hasta cinco tipos raciales diferentes.

Se realizó un análisis de regresión múltiple (SASv9; *proc reg, selection, rsquare, cp*)⁽¹⁶⁾ a

first parturition (AFP, in days). Data included crosses of different degrees based on purebred Zebu and crossbred cows; analysis of retention of heterosis (i.e. hybrid vigor) was therefore done by identifying the proportions of the maternal and paternal breeds.

Retained heterosis (*RVH*) was estimated with the formula⁽¹⁵⁾:

$$RVH = \left(1 - \sum_{i=1}^n Ps_i Pm_i \right)$$

Where Ps_i is the proportion of the father's n th breed; Pm_i is the proportion of the mother's n th breed; and n is the total number of breeds involved.

Cows were kept in groups of variable sizes and fed based on rotational grazing on tropical grasses. Mating was done by controlled natural mounting and artificial insemination (semen imported from the United States). Sire selection criteria was arbitrary given that the producer chose bull breeds based on personal preferences with the expectation that an optimum cross would result from cow breed combination. As a result, breed proportions vary from purebreds to individuals with contributions from up to five different breeds.

A multiple regression analysis (SASv9; *proc reg, selection, rsquare, cp*)⁽¹⁶⁾ was run to identify the effects of breed composition on WW and AFP. These were based on the Mallows statistic C(p) and the coefficient of determination (R^2)⁽¹⁷⁾ of the relevant crosses between *B. indicus* and the different *B. taurus* breeds to determine which breeds had significant effects on WW. The analysis was done using a model that included the effects of annual environment (grouped into five categories, each accounting for 20 % of the data between 1966 and 2006) and birth season (April to September and October to March). The percentage of *B. indicus* genes (C) was included as a covariate to estimate optimum *B. indicus*: *B. taurus*

fin de identificar el efecto de las composiciones raciales sobre las características de PD y EPP, con base en el valor del estadístico de Mallow C(p) y del coeficiente de determinación (R^2)⁽¹⁷⁾, de las cruzas relevantes entre *B. indicus* y los distintos tipos raciales de *B. taurus*, para poder determinar qué razas tenían un efecto significativo en el peso al destete.

El análisis se realizó con un modelo que incluyó los efectos ambientales de año (agrupándolo en cinco categorías, cada una con el 20 % de los datos desde 1966 hasta el año 2006) y época de nacimiento dependiendo de la época de lluvias (de abril a septiembre y de octubre a marzo), mientras que el porcentaje de genes *B. indicus* (C) se incluyó como covariante, para estimar las proporciones óptimas de *B. indicus* y *B. taurus*; así mismo, se generó el mismo modelo usando el valor de RVH (H) como covariante, para estimar el valor de RVH óptimo para PD y EPP de acuerdo al siguiente modelo⁽¹⁸⁾:

$$Y_{ijkl} = \mu + A_i + E_j + b_1 C_k + b_2 C^2_k + b_3 C^3_k + e_{ijkl}$$

Donde Y_{ijkl} es la i -ésima observación aleatoria del peso al destete ajustado y/o edad a primer parto; μ es la media general; A_i es el efecto del i -ésimo año; E_j es el efecto de la j -ésima época de nacimiento; C es el porcentaje de genes *Bos indicus* o la heterosis retenida (RVH); b_1 , b_2 , b_3 son los coeficientes de regresión para C , en su forma lineal, cuadrática y cúbica; e_{ijkl} el error experimental. $DNI \sim (0, \sigma^2)$.

Con objeto de estimar la mejor proporción de la raza(s) europea(s) con el cebú se utilizó el método stepwise (SAS v9), definiendo el mejor modelo de acuerdo al coeficiente de determinación (R^2) y el estadístico de Mallow; el mejor modelo se graficó con el programa *MatLab* (con el procedimiento *plots*) y se obtuvieron el o los puntos de inflexión de acuerdo a la primera derivada (*MatLab; roots*)⁽¹⁹⁾, que permite estimar a ese punto como los valores óptimos de heterosis para las

proporciones. The same model was generated using the RVH (H) value as a covariate to the optimum RVH value for WW and AFP according the model⁽¹⁸⁾:

$$Y_{ijkl} = \mu + A_i + E_j + b_1 C_k + b_2 C^2_k + b_3 C^3_k + e_{ijkl}$$

Where Y_{ijkl} is the i -th random observation of adjusted WW and/or AFP; μ is the general mean; A_i is the effect of the i -th year; E_j is the effect of the j -th birth season; C is the percentage of *B. indicus* genes or retained heterosis (RVH); b_1 , b_2 , b_3 are the regression coefficients for C in its linear, quadratic and cubic forms (respectively); and e_{ijkl} is experiment error. $DNI \sim (0, \sigma^2)$.

A stepwise analysis (SAS v9), was run to estimate the optimum proportion of Zebu to European breeds, defining the best model based on the coefficient of determination (R^2) and the Mallow statistic. The best model was graphed using the *plots* procedure in the *MatLab* program to generate the inflection points according to the first derivative (*MatLab; roots*)⁽¹⁹⁾. This allowed estimation of this point as the optimum heterosis values for WW and AFP in *B. indicus* x *B. taurus* crosses.

RESULTS

No differences ($P > 0.05$) were identified in the analysis of variance between the Zebu and European breeds, or the crosses, for either of the studied variables (Table 1). This absence of difference is most probably due to very high variation in the Zebu breed compared to other breeds; for instance, compared to European breeds it is five times more variable in terms of WW and three times more variable for AFP, while compared to crosses it is eleven times more variable. Indeed, crosses and European breeds tend to be much more homogeneous in their responses.

Selection for the best model showed the Zebu x Simmental cross to contribute most ($P < 0.05$)

Cuadro 1. Promedios, desviaciones estándar (S) y coeficientes de variación (CV) para peso al destete ajustado a 270 días y edad al primer parto en vacas Cebú, *Bos Taurus* (todos los animales de raza pura europea), Charolais, Holstein, Simmental, Suizo y cruzas entre dos o más razas

Table 1. Averages, standard deviations (S) and coefficients of variation (CV) for 270-d adjusted weaning weight and age at first parturition in Zebu, *Bos Taurus* (all European purebreds), Charolais, Holstein, Simmental, Swiss and crosses between two or more breeds

Breed	Weaning weight		Age at first parturition	
	$\bar{X} \pm S$	CV (%)	$\bar{X} \pm S$	CV (%)
Zebu	209.85±20.69	9.85	1109.55± 99.35	8.95
<i>Bos Taurus</i>	222.52± 4.73	2.12	1100.48± 29.83	2.71
Charolais	253.16±13.09	5.17	1181.59± 74.51	6.30
Holstein	228.79±18.51	8.09	914.82±112.65	12.31
Simmental	213.83± 6.38	2.98	1123.61± 40.94	3.64
Swiss	223.89± 9.25	4.13	1049.47± 60.84	5.79
Crosses	225.52± 4.73	2.09	1099.00± 9.01	0.82

características PD y EPP en la crusa de *B. indicus* con *B. taurus*.

RESULTADOS

El Cuadro 1 muestra los promedios, desviaciones estándar (S) y coeficientes de variación (CV) para peso al destete ajustado a 270 días y edad al primer parto en vacas Cebú, *Bos Taurus* (todos los animales de raza pura europea), Charolais, Holstein, Simmental, Suizo y Cruzadas entre dos o más razas. Si bien el análisis de varianza no mostró diferencias ($P>0.05$) entre la raza cebú con las europeas y las cruzas en ninguna de las variables estudiadas, esto puede deberse a que la variación observada en la raza cebú es cinco veces mayor en peso al destete y tres veces mayor en edad al primer parto con respecto a las razas europeas, así como 11 veces mayor con respecto a las vacas cruzadas, siendo los animales cruzados y europeos más homogéneos en su respuesta.

En el Cuadro 2 se presentan los coeficientes de determinación, los estadísticos de Mallow y el error estándar para la selección del mejor modelo a partir del análisis de regresión múltiple,

to explaining the variation, both for WW (46.13 %) and AFP (9.09 %) (Table 2). For crosses of three or more breeds, contributions by Salers and Charolais sires increased WW by 12 and 4 %, respectively, while four-breed crosses increased this variable by 12.57 %. In contrast, AFP increased less than 1 % in crosses of three or more breeds.

The WW coefficient of determination results for the linear, quadratic and cubic models showed the different European breeds to contribute equally when crossed with *B. indicus* (Table 3). For WW, the quadratic model explained 23.8 % ($P<0.01$) of variation, suggesting the presence of complementarity between Zebu and the European breeds. When three or more breeds were combined, this heterosis increased; such is the case for the crosses Zebu x Charolais x Swiss ($R^2=0.1469$; $P<0.0051$); Zebu x Charolais x Simmental ($R^2=0.3016$; $P<0.0001$); Zebu x Charolais x Simmental x Salers ($R^2=0.3225$ $P<0.0001$); and Zebu x Charolais x Swiss x Simmental x Salers ($R^2=0.2411$; $P<0.0001$).

The coefficients of determination and significance levels for AFP identified complementarity between *B. indicus* and *B.*

Cuadro 2. Análisis de regresión para la selección de los modelos para peso al destete (WW) y edad al primer parto (AFP) ($P<0.05$)

Table 2. Regression analysis for model selection ($P<0.05$) for 270-d adjusted weaning weight (WW) and age at first parturition (AFP)

Breeds	R ²	C _(p)	SE
WW			
Zebu x Charolais	0.0505	40.51	6970.89
Zebu x Swiss	0.0300	41.45	7121.45
Zebu x Simmental	0.4613	21.69	3955.21
Zebu x Charolais x Swiss	0.5739	18.52	3753.85
Zebu x Simmental x Salers	0.5809	18.20	3692.08
Zebu x Charolais x Simmental	0.5017	21.83	4390.25
Zebu x Charolais x Simmental x Salers	0.5870	19.92	4547.78
Zebu x Charolais x Swiss x Simmental x Salers	0.9345	6.00	961.14
AFP			
Zebu x Holstein	0.0873	1.29	37640
Zebu x Simmental	0.0909	1.13	37490
Zebu x Charolais x Holstein	0.0930	3.04	38319
Zebu x Simmental x Holstein	0.0938	3.01	38284
Zebu x Charolais x Swiss x Simmental	0.0940	5.00	39231
Zebu x Charolais x Swiss x Simmental x Holstein	0.0940	4.99	39231

R^2 = coefficient of determination, $C_{(p)}$ = Mallow statistic, SE= standard error.

Significant results used in figures are indicated in bold.

mostrando la contribución del cruzamiento de dos, tres o más razas ($P<0.05$) sobre las variables estudiadas; estos resultados revelaron que el cruce con las razas Cebú y Simmental son las que mayor contribuyen en la explicación de la variación, tanto de peso al destete ajustado, como de edad al primer parto, siendo 46.13 y 9.09 % respectivamente.

En el análisis de cruces con tres o más razas se observó que para peso ajustado al destete, la contribución de sementales de raza Salers o Charolais incrementan la respuesta en 12 y 4 % respectivamente, mientras que el uso de cuatro razas incrementa en 12.57 % el peso al destete. Sin embargo, con respecto a edad al primer parto, sólo se observó un incremento menor al 1 % con la cruzas de tres o más razas.

En el Cuadro 3 se presentan los coeficientes de determinación de los modelos lineal, cuadrático

taurus genes as expressed in the quadratic model ($R^2=0.1843$; $P<0.0001$). The best heterosis response occurred in the Zebu x Simmental cross ($R^2=0.4796$; $P<0.0334$).

270-day adjusted weaning weight (WW)

The contribution of *B. indicus* based on the quadratic model ($R^2=0.238$; $P<0.01$; Figure 1), produced the greatest heterosis response at a 50.22 % Zebu allele proportion, which resulted in a WW of 239 kg. However, this assumes an equal contribution of all the European breeds to WW, with each breed potentially contributing positively or negatively.

When analyzed by cross (Table 5), the quadratic model ($R^2=0.1469$; $P<0.05$) showed the *B. indicus* x Charolais x Swiss cross to have the lowest response in WW (220.13 kg) with 36.5 % *B. indicus* genes. In contrast, the *B. indicus* x

Cuadro 3. Coeficiente de determinación (R^2) para cada modelo de peso al destete ajustado a 270 díasTable 3. Coefficient of determination (R^2) for each 270-d adjusted weaning weight model

	Linear	$P<$	Quadratic	$P<$	Cubic	$P<$
<i>B. indicus</i> x <i>B. taurus</i>	0.2338	0.0001	0.2380	0.0001	0.2384	0.0001
Charolais	0.2659	0.1471	0.3165	0.1310	0.3346	0.1708
Swiss	0.1666	0.1321	0.1675	0.2085	0.1694	0.2961
Simmental	0.1516	0.7079	0.1518	0.8151	0.1535	0.8880
Charolais-Swiss	0.1449	0.0027	0.1469	0.0051	0.1470	0.0096
Simmental-Salers	0.3025	0.0743	0.3090	0.1147	0.3529	0.0984
Charolais-Simmental	0.2972	0.0001	0.3016	0.0001	0.3026	0.0001
Charolais-Simmental-Salers	0.3184	0.0001	0.3225	0.0001	0.3229	0.0001
Charolais-P.S.-Simmental-Salers	0.2368	0.0001	0.2411	0.0001	0.2415	0.0001

P = significance level. Significant results used in figures are indicated in bold.

Cuadro 4. Coeficiente de determinación (R^2) para cada modelo de edad a primer partoTable 4. Coefficient of determination (R^2) for each age at first parturition model

	Linear	$P<$	Quadratic	$P<$	Cubic	$P<$
<i>B. indicus</i> x <i>B. taurus</i>	0.1835	0.0001	0.1843	0.0001	0.1845	0.0001
Simmental	0.4376	0.0328	0.4796	0.0334	0.5192	0.0342
Holstein	0.0999	0.8777	0.1083	0.9541	0.1083	0.9541
Simmental-Holstein	0.1918	0.1655	0.1932	0.2450	0.2129	0.2630
Charolais-Holstein	0.0753	0.5125	0.0756	0.6325	0.0803	0.7004
Charolais-P.S.-Simmental	0.1781	0.0001	0.1783	0.0001	0.1783	0.0001

P = significance level. Significant results used in figures are indicated in bold.

y cúbico de las cruzas entre *B. indicus* con razas europeas para PD ajustado a 270 días; en la crusa con *B. taurus*, se considera igual la contribución de todas las razas europeas analizadas en este estudio, observando que el modelo cuadrático explicó el 23.8 % ($P<0.01$); este resultado sugiere que existe una complementariedad de los genes Cebú y razas europeas para peso al destete. Esta heterosis, es mayor cuando existe la combinación de tres o más razas, tal es el caso de Cebú x Charolais x Suizo ($R^2=0.1469$; $P<0.0051$); Cebú x Charolais x Simmental ($R^2=0.3016$; $P<0.0001$); Cebú x Charolais x Simmental x Salers ($R^2=0.3225$ $P<0.0001$) y Cebú x Charolais x Suizo x Simmental x Salers ($R^2=0.2411$; $P<0.0001$).

Charolais x Simmental cross had the highest response in WW (245.13 kg) with 70.75 % *B. indicus* genes, as explained by the quadratic model ($R^2=0.3016$; $P<0.0001$). For a cross between four breeds (*B. indicus* x Charolais x Simmental x Salers), the quadratic model ($R^2=0.3225$; $P<0.0001$) showed an optimum response (WW= 243.72 kg) at 66.5 % *B. indicus* genes. Therefore, optimum heterosis response was had with 36.5 to 70.75 % *B. indicus* genes in combinations of three to four breeds; the highest WW was observed with the *B. indicus* x Charolais x Simmental cross. Complementarity between *B. indicus* and *B. taurus* can largely explain this improved WW since *B. indicus* genes contribute greater environmental adaptability while *B. taurus* genes provide greater growth capacity.

Con respecto a edad a primer parto, los coeficientes de determinación y significancia se muestran en el Cuadro 4. Estos resultados revelan que existe complementariedad entre los genes *B. indicus* con *B. taurus* expresado por el modelo cuadrático ($R^2=0.1843$; $P<0.0001$). Sin embargo, la mayor respuesta a heterosis se observó en la cruce de Cebú x Simmental ($R^2=0.4796$; $P<0.0334$).


Peso al destete ajustado a 270 días (PD)

La respuesta a heterosis estimada a partir de la contribución de *B. indicus*, se muestra en la Figura 1 a partir del modelo cuadrático ($R^2=0.238$; $P<0.01$). En estos resultados se observa que la mayor respuesta de heterosis se alcanza cuando la proporción de alelos cebuinos se encuentra cercano a 50.22 %, siendo el PD de 239 kg. Sin embargo, estos resultados suponen que el complemento de todas las razas europeas contribuye igualmente en la característica, siendo que cada raza puede contribuir positiva o negativamente.

En el Cuadro 5 se presenta el análisis por cruce; la cruce de *B. indicus* x Charolais x Suizo tuvo la menor respuesta de PD cuando existe un 36.5 % de genes *B. indicus* con 220.13 kg, explicado por el modelo cuadrático ($R^2=0.1469$; $P<0.05$). Así mismo la cruce de *B. indicus* x Charolais x Simmental, tiene el mayor PD cuando tiene el 70.75 % de genes *B. indicus* y está expresado por el modelo cuadrático ($R^2=0.3016$; $P<0.0001$) con un PD de 245.13 kg. La cruce de cuatro razas: *B. indicus* x Charolais x Simmental x Salers, está justificada por el modelo cuadrático ($R^2=0.3225$; $P<0.0001$) con un valor óptimo de genes *B. indicus* de 66.5 % y con un peso de 243.72 kg. Por lo anterior se puede ubicar la mejor respuesta a heterosis dentro del rango de 36.5 a 70.75 % de genes *B. indicus* en la contribución de 3 y 4 razas, teniendo el mayor peso en la cruce *B. indicus* x Charolais x Simmental. Esto puede ser explicado por una mejor adaptabilidad al medio ambiente debido a la complementariedad de las razas involucradas, dado que los genes *B.*

Figura 1. Respuesta a heterosis en la cruce de *Bos indicus* x *Bos taurus* para peso al destete ajustado a 270 días (WW) y para edad a primer parto (AFP)

Figure 1. Response to heterosis in *Bos indicus* x *Bos taurus* crosses for 270-d adjusted weaning weight (WW) and age at first parturition (AFP)



In the five-breed cross (*B. indicus* x Charolais x Swiss x Simmental x Salers), optimum response (WW= 236.08 kg) according to the quadratic model ($R^2=0.2411$; $P<0.0001$) was observed with 49.94 % *B. indicus* genes. It is of note that this proportion is nearly that of a basic *B. indicus* x *B. taurus* cross (50 % *B. indicus* genes), and that the response was lower than for a Charolais x Simmental cross. This is consistent with previous reports showing that crosses between Angus, Hereford and Shorthorn breeds exhibit up to an 18.9 % better response in WW than purebred animals⁽⁴⁾.

indicus contribuye con una mayor adaptabilidad al medio ambiente y los genes *B. taurus* aportan una mejor capacidad de crecimiento. Así mismo, en la crusa de cinco razas: *B. indicus* x Charolais x Suizo x Simmental x Salers, se obtuvo la mejor respuesta con un porcentaje de genes *B. indicus* de 49.94 %, con un peso de 236.08 kg y es explicada por el modelo cuadrático ($R^2=0.2411$; $P<0.0001$), sin embargo, es menor la respuesta que en la crusa con Charolais y Simmental. La crusa de cinco razas muestra una relación similar a la presentada para la crusa *B. indicus* x *B. taurus* cercana al 50 % de genes *B. indicus*. Se ha estimado que las cruzas entre Angus, Hereford y Shorthorn tuvieron una superioridad de hasta 18.9 % de animales con cruzados sobre los animales de razas puras⁽⁴⁾.

Edad a primer parto (EPP)

La respuesta a heterosis para EPP en la crusa *B. indicus* x *B. taurus*, se puede ver en la Figura 1; el efecto del porcentaje racial de origen

Age at first parturition (AFP)

For AFP, the best heterosis response (average= 1052.31 d) for the overall *B. indicus* x *B. taurus* cross was shown by the quadratic model ($R^2=0.1843$; $P<0.0001$), with a 40.20 % *B. indicus* gene proportion (Figure 1). The *B. indicus* x Simmental cross had the best response (1083.41 d AFP) with 30.68 % *B. indicus* genes, according to the quadratic model ($R^2=0.4796$; $P=0.0334$; Table 5). These results confirm the advantages of using *B. indicus* x *B. taurus* crosses to improve cattle reproductive traits, and agree with a report of AFP in crosses between Angus, Hereford and Shorthorn, that showed these to have younger AFP than purebreds⁽⁴⁾. This is supported by another report indicating the superiority of crosses (Angus, Brahman, Brangus and Hereford) over purebreds in other reproductive traits such as calves born and weaned calves⁽¹⁾. In a study of purebred Criollo and Guzerat cows and their F1 crosses, estimated individual heterosis and

Cuadro 5. Máxima respuesta a heterosis (MHR) de acuerdo a los modelos para peso al destete ajustado a 270 días (WW), edad a primer parto (AFP) y para la retención de heterosis (RVH)

Table 5. Maximum heterosis response (MHR) based on 270-d adjusted weaning weight (WW) models, age at first parturition (AFP) models and retention of heterosis (RVH)

	Equation	MHR (%)	
WW			
<i>B. indicus</i> x <i>B. taurus</i>	$WW= 222.3608+0.6629*C-0.0066*C^2$	50.22	239.00 kg
Charolais-Simmental	$WW=214.7215+0.8596*C-0.0061*C^2$	70.75	245.13 kg
Charolais-Swiss	$WW=216.1266+0.2191*C-0.0029*C^2$	36.50	220.13 kg
Charolais-Simmental-Salers	$WW=216.6918+0.8010*C-0.006*C^2$	66.50	243.72 kg
Charolais-Swiss-Simmental-Salers	$WW=220.0803+0.64*C-0.0064*C^2$	49.94	236.08 kg
AFP			
<i>Bos indicus</i> x <i>Bos taurus</i>	$AFP=1069.46-0.8531*C+0.0106*C^2$	40.20	1052.31 days
Simmental	$AFP=1218.72-8.8190*C+0.1436*C^2$	30.68	1083.41 days
RVH			
Quadratic	$WW=209.2959+55.59*H-36.36*H^2$	76	232.58 kg
Cubic	$WW=215.33+5.42*H+70.65*H^2-63.12*H^3$	78	
Quadratic	$AFP=1070.26-59.9331*H+32.5085*H^2$	92	1023.33 days
Cubic	$AFP=1045.57+236.38*H-699.24*H^2+461.27*H^3$	79	

WW and AFP model equations: C represents percentage of *B. indicus* genes. RVH equations: H represents retention of heterosis.

cebuino, fue representado por el modelo cuadrático ($R^2=0.1843$; $P<0.0001$) teniendo la mejor respuesta de EPP cuando el porcentaje de genes *B. indicus* se ubicó en 40.20 % con un promedio de 1052.31 días.

La crusa de *B. indicus* x Simmental se explica por el modelo cuadrático que se encuentra en el Cuadro 5 ($R^2=0.4796$; $P=0.0334$), teniendo la mejor respuesta a heterosis con un 30.68 % de genes cebuinos con 1083.41 días de EPP. Diversos estudios mencionan la importancia de utilizar animales cruzados *B. indicus* x *B. Taurus* para mejorar las características reproductivas. Se ha reportado que animales con cruzas entre Angus, Hereford y Shorthorn tuvieron una EPP inferior a animales de razas puras, en concordancia con los resultados de este estudio⁽⁴⁾. Así mismo en otro estudio, explicaron la superioridad de animales cruzados (Angus, Brahman, Brangus y Herford) sobre animales de razas puras en otras características reproductivas, como becerros nacidos y becerros destetados⁽¹⁾. También en otra publicación, estimaron la heterosis individual y compararon las tasas de estro, gestación, parición y destete para vacas Criollo, Guzerat y sus crías F1, concluyendo la viabilidad de las cruzas para aprovechar el efecto de la heterosis y mejorar la fertilidad⁽¹²⁾.

Heterosis retenida (RVH)

Debido al origen de los datos, característico de las ganaderías productoras de carne en sistemas extensivos en el trópico, el uso de cruzamientos donde se incluyen varias razas, hace que exista una gran variación racial de los animales; por lo que la estimación de heterosis retenida (RVH) permite establecer el comportamiento fenotípico en función de la contribución de los progenitores, ya sean puros o cruzados.

Con respecto al PD, se observó un incremento a medida que el grado de heterosis fue aumentando, alcanzando la mayor respuesta en los niveles de 76 a 78 % de retención de heterosis distribuido en diferentes razas. Esto

comparisons of estrus, gestation, parturition and weaning highlighted the advantages of heterosis in the crosses to improve fertility⁽¹²⁾.

Retained heterosis (RVH)

The data analyzed in the present study are characteristic of beef cattle producers in extensive tropical conditions. Use of crosses involving a number of different breeds results in wide genetic variation. Estimation of RVH can establish phenotypic behavior as a function of progenitor contribution, be they purebred or crosses. As degree of heterosis increased so did WW, reaching levels of 76 -78 % RVH among the different breeds (Table 5). For every RVH unit, WW increased 0.276 kg, reaching a maximum of 232.58 kg. This was explained by both the quadratic ($R^2=0.2370$; $P<0.0001$) and cubic ($R^2=0.2375$ $P<0.0001$) models. For AFP, maximum RVH occurred between 79 and 92 %, with a minimum value of 1023.33 d; this was explained by the quadratic ($R^2=0.1792$; $P<0.0001$) and cubic ($R^2=0.1813$; $P<0.0001$) models.

In a comparison of RVH values for WW and AFP, and their corresponding averages (Table 6), the highest WW was expressed with an approximately 80 % RVH, both for the quadratic (230.49 kg) and cubic (232.56 kg) models. The lowest AFP occurred at 90 % RVH in the quadratic model (1,042.65 d) and at 80 % RVH in the cubic model (1,023.33 d). Therefore, the best heterosis response is attained at between 80 and 90 % RVH.

DISCUSSION

Animal growth directly affects productive performance, including WW and AFP. Heterosis has a well-documented beneficial effect on productive traits, indeed, it is popularly known as hybrid vigor. The *B. indicus* x *B. taurus* cross is widely used for its complementarity, with proportions quantified as fractions of the breeds involved. The most frequently used fraction is 3/8 *B. indicus* - 5/8 *B. taurus*, which is known to have good performance. However, in the

se muestra en el Cuadro 5, observando un incremento de 0.276 kg por cada unidad de retención de heterosis, y es explicado por el modelo cuadrático ($R^2=0.2370$; $P<0.0001$) y por el modelo cúbico ($R^2=0.2375$ $P<0.0001$) con un peso al destete ajustado máximo de 232.58 kg.

También se observa la retención de heterosis óptima para tener una menor EPP y fue representada por el modelo cuadrático ($R^2=0.1792$; $P<0.0001$) y por el modelo cúbico ($R^2=0.1813$; $P<0.0001$) ubicando la proporción de retención de heterosis óptima entre un 79 y un 92 % con un valor mínimo de 1023.33 días de edad a primer parto. En el Cuadro 6 se muestran los diferentes porcentajes de retención de heterosis con sus respectivos promedios para el PD y la EPP. El mayor PD se expresó con una RVH alrededor del 80 %, tanto para el modelo cuadrático (230.49 kg) como para el modelo cúbico (232.56 kg). La menor EPP se obtuvo con una RVH del 90 % en el modelo cuadrático con 1,042.65 días y con una RVH del 80 % en el modelo cúbico con 1,023.33 días. Esto explica que la mejor respuesta a heterosis se alcanza con una RVH entre el 80 y 90 %.

DISCUSIÓN

El crecimiento de un animal impacta directamente sobre el desempeño de éste sobre todo el proceso productivo, influyendo en características como el PD y la EPP. Se ha discutido en varias publicaciones, el efecto benéfico que tiene la heterosis sobre las características productivas, llegando a ser muy popular y conocido como vigor híbrido. Para este fin, con más frecuencia se utilizan cruzas entre ganado *B. indicus* y *B. taurus*; las proporciones, por lo regular, se manejan en fracciones.

La proporción más frecuentemente usada es la de 3/8 *B. indicus* - 5/8 *B. taurus*, teniendo buen comportamiento; sin embargo, los resultados muestran que la heterosis se manifiesta en un rango de 42 al 70 % de genes *B. indicus* para

Cuadro 6. Retención de heterosis (RVH) para peso al destete (WW) y edad al primer parto (AFP)

Table 6. Retention of heterosis (RVH) for 270-d adjusted weaning weight (WW) and age at first parturition (AFP)

RVH	WW		AFP	
	%	Quadratic	Cubic	Quadratic
0	209.29	215.33	1070.26	1045.57
10	214.49	216.51	1064.59	1062.67
20	218.95	218.73	1059.57	1068.56
30	222.70	221.61	1055.20	1066.00
40	225.71	224.76	1051.48	1057.76
50	228.00	227.81	1048.42	1046.60
60	229.56	230.38	1046.00	1035.30
70	230.39	232.09	1044.23	1026.62
80	230.49	232.56	1043.11	1023.33
90	229.87	231.42	1042.65	1028.19
100	228.52	228.28	1042.83	1043.98

Averages for WW and AFP quadratic and cubic models calculated for different RVH percentages.

present WW results heterosis was expressed in a 42 to 79 % range of *B. indicus* genes; this is similar to fractions of 2/5 to 3/5 *B. indicus*. In other words, it is roughly equivalent to the hybrid vigor to be expected in an F1 hybrid (i.e. 50 % of each breed).

For AFP, the best response (1,051 d) was produced with 30 to 40 % *B. indicus* genes. This is roughly equivalent to fractions of 3/10 *B. indicus* and 7/10 *B. taurus*, a proportion slightly nearer the common 3/8 *B. indicus* to 5/8 *B. taurus* proportion.

Retention of heterosis manifested the highest potential for WW at 76 to 78 % and for AFP at 79 to 92 %. This confirms that reproductive trait responses improve as heterosis retention increases, in agreement with the relevant literature.

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS

Bos taurus x *Bos indicus* crosses effectively take advantage of hybrid vigor, improving weaning

PD; es decir aproximadamente 2/5 a 3/5 de *B. indicus* aproximadamente, que bien puede considerarse como al efecto esperado de vigor híbrido en la F₁ (50 % de cada raza).

Para la característica reproductiva EPP se puede concluir que la mejor respuesta a la heterosis para tener una menor edad a primer parto la encontramos con una proporción de genes cebúinos que va del 30 al 40 %, teniendo la menor edad con 1,051 días, siendo esto aproximadamente 3/10 de *B. indicus* y 7/10 de *B. Taurus*, aproximándose un poco más de la relación comúnmente usada de 3/8 *B. indicus* y 5/8 *B. taurus*.

La retención de heterosis que mostró mayor potencial para PD fue de 76 a 78 % y para EPP de 79 a 92 %, indicando que entre mayor retención de heterosis, se tiene una mejor respuesta que se expresa para las características productivas, concordando con lo que refiere la bibliografía.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Las cruzas entre razas *Bos taurus* con *Bos indicus* se pueden utilizar para aprovechar el vigor híbrido, aumentando las características de peso al destete y de edad a primer parto gracias a la complementariedad de las razas, siempre y cuando la proporción de genes *Bos indicus* respecto a *Bos taurus* oscile entre 30 al 40 % para EPP, mientras que para el PD la proporción óptima de genes *Bos indicus* se encuentra en el rango de 42 al 70 %, por lo que es útil en producciones donde se utilicen como animales terminales, o en donde se tiene establecido un sistema de cruzamientos adecuado.

LITERATURA CITADA

- Turner JW, Farthing BR, Robertson GL. Heterosis in reproductive performance of beef cows. J Anim Sci 1968;27:336-338.
- Dickerson GE. Experimental approaches in utilizing breed resources. Anim Breed Abstr 1969;37:191-202.
- Koger M, Cunha TJ, Warnick AC editors. Crossbreeding beef cattle. Series 2. Florida, USA: University of Florida Press; 1973.
- Cundiff LV, Gregory KE, Koch RM. Effects of heterosis on reproduction in Hereford, Angus and Shorthorn Cattle. J Anim Sci 1974;38:711-727.
- Franke DE. Breed and heterosis effects of American Zebu cattle. J Anim Sci 1980;50:1206-1214.
- Plasse D. Crossbreeding results from beef cattle in the Latin American tropics. Anim Breed Abstr 1983;51(11):779-797.
- Plasse D. Estrategias de cruzamiento en ganado de carne. II Cursillo sobre Bovinos de Carne. UCV, Facultad de Ciencias Veterinarias. Maracay, Venezuela. 1986.
- Koch RM, Dickerson GE, Cundiff LV, Gregory KE. Heterosis retained in advanced generations of crosses among Angus and Hereford cattle. J Anim Sci 1985;60(5):1117-1131.
- Romero R, Plasse D, Camaripano L. Producción de vacas F1 (*Bos taurus* x *Bos indicus*) apareadas con toros cruzados en un hato al sur de Barinas. UCV, Facultad de Ciencias Veterinarias. Barinas, Venezuela, 1997.
- Chirinos Z, Rincón E, Madrid-Bury N, González-Stagnaro C. Crecimiento predestete de becerros mestizos *Bos taurus* x *Bos indicus*. Arch Latinoam Prod Anim 1997;5(Supl 1) 497-499.
- Rosales AJ, Elzo MA, Montaño BM, Vega MV, Reyes VA. Parámetros genéticos para pesos al nacimiento y destete en ganado Simmental - Brahman en el subtropical mexicano. Téc Pecu Méx. 2004;42(3):333-346.
- Martínez VG, Montaño BM, Palacios FJA. Efectos genéticos directos, maternos y heterosis individual para tasas de estro, gestación, parición y destete de vacas Criollo, Guzerat y sus cruzas F1. Téc Pecu Méx 2006;44(2):143-154.
- Crockett JR, Koger M, Franke DE. Rotational crossbreeding of beef cattle: preweaning traits by generation. J Anim Sci 1978;46:1170-1177.
- López OR, García CR, García MJG, Ramírez VR. Producción de leche de vacas con diferente porcentaje de genes *Bos taurus* en el trópico mexicano. Téc Pecu Méx 2009;47(4):435-448.
- Bourdon RM. Understanding animal breeding. 2nd ed. USA, NJ, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River; 2000.

weight and age at first parturition due to breed complementarity. To obtain these responses, *Bos indicus*: *Bos taurus* proportions need to range from 30 to 40 % for AFP and from 42 to 70 % for WW. These proportions are useful in production systems involving terminal animals or using an adequate genetic improvement system.

End of english version

EFFECTO DE LA PROPORCIÓN DE GENES SOBRE CARACTERÍSTICAS DE PESO AL DESTETE

16. SAS. Institute, Inc. SAS/STAT Users Guide, version 9.2 ed. Cary, North Carolina, USA: SAS Institute Inc., 1997.
17. Neter J, Wasserman W, Kunter MH. Applied linear regression models. 2nd ed. USA, Irwin, Inc., 1989.
18. Mrode RA, Thompson R. Linear models for the prediction of animal breeding values. 2nd ed. USA, CABI Publishing, 2005.
19. The MathWorks, Inc., User MATLAB 7, Getting started guide, USA, The MathWorks, Inc. 2009.

